

AmarCAND2 - Étude épidémiologique du traitement antifongique systémique des candidoses invasives prouvées ou suspectées en réanimation

Responsable(s) : Direction Médicale MSD France

Date de modification : 29/10/2020 | Version : 1 | ID : 73350

Général

Identification

Nom détaillé Étude épidémiologique du traitement antifongique systémique des candidoses invasives prouvées ou suspectées en réanimation

Sigle ou acronyme AmarCAND2

Thématiques générales

Domaine médical Maladies infectieuses

Pathologie, précisions Candidose

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Direction Médicale MSD France

Collaborations

Financements

Financements Privé

Précisions MSD France

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur MSD France

Statut de l'organisation Secteur Privé

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données Bases de données issues d'enquêtes

Objectif de la base de données

Objectif principal	Description des modalités de prescription des traitements antifongiques systémiques* en réanimation dans un contexte d'infection à <i>Candida</i> suspectée ou prouvée (hors prophylaxie**). Analyse des déterminants de la prescription Analyse des motifs de changement du TAF initial (arrêt ou désescalade) Description des explorations complémentaires et traitements associés au TAF (*) intra-veineux ou fluconazole 800 mg per os (**) prophylaxie : traitement instauré en l'absence de tout signe de sepsis
--------------------	--

Critères d'inclusion	Inclusion : Patients adultes hospitalisés en réanimation et recevant un traitement antifongique systémique* pour une candidose invasive suspectée ou prouvée et traitée au cours du séjour en réanimation. (*) intra-veineux ou fluconazole 800 mg per os Non-inclusion : Patients âgés de moins de 18 ans Patients neutropéniques ($< 500/\text{mm}^3$) Patients greffés (organes solides) depuis moins de 15 jours Patients inclus dans un essai interventionnel sur les antifongiques et/ou les antibiotiques dans les 3 mois précédant l'inclusion Patients recevant un TAF pour une infection à champignon filamenteux Patients recevant un TAF prophylactique (c'est-à-dire traitement instauré en l'absence de tout signe de sepsis)* (*) Un traitement antifongique préopératoire avant laparotomie exploratrice pour suspicion de péritonite n'est pas considéré comme prophylactique.
----------------------	--

Type de population

Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
-----	--

Population concernée	Sujets malades
----------------------	----------------

Pathologie	B37 - Candidose
------------	-----------------

Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	Pas de détail
Collecte	
Dates	
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[500-1000[individus
Détail du nombre d'individus	800
Données	
Activité de la base	Collecte des données terminée
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives Données biologiques
Existence d'une bibliothèque	Non
Modalités	
Suivi des participants	Oui
Modalités de suivi des participants	Suivi par contact avec le médecin référent ? traitant
Appariement avec des sources administratives	Non
Valorisation et accès	
Valorisation et accès	
Accès	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	pas de chartre d'accès aux données
Accès aux données agrégées	Pas d'accès
Accès aux données individuelles	Accès pas encore planifié

