

# PERFECTA - Intravenous analgesics for post-operative pain: patterns of use in high-risk populations

Responsable(s) :Boccard Éric, Bristol-Myers Squibb  
Schmidely Nathalie, Bristol-Myers Squibb

Date de modification : 01/01/2018 | Version : 1 | ID : 126

## Général

### Identification

Nom détaillé Intravenous analgesics for post-operative pain: patterns of use in high-risk populations

Sigle ou acronyme PERFECTA

Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) --

### Thématiques générales

Déterminants de santé Iatrogenic

Autres, précisions Pain

Mots-clés Post-chirurgical, treatment for pain, IV pain killers

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Boccard  
Prénom Éric  
Adresse 3, rue J. Monier - 92500 Rueil Malmaison  
Téléphone +33 (0)1 58 83 60 00  
Email eric.boccard@bms.com  
Laboratoire Bristol-Myers Squibb

Nom du responsable Schmidely  
Prénom Nathalie  
Adresse 3, rue J. Monier - 92500 Rueil Malmaison  
Téléphone +33 (0)1 58 83 60 00  
Email nathalie.schmidely@bms.com

Laboratoire	Bristol-Myers Squibb
Collaborations	
Financements	
Financements	Private
Précisions	Bristol-Myers Squibb
Gouvernance de la base de données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	Bristol-Myers Squibb France (BMS)
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Study databases
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Not-repeated cross-sectional studies (except case control studies)
Origine du recrutement des participants	A selection of health institutions and services
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	No
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon	random sampling in clusters
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Describe the post-surgical drug treatment for pain after a surgical intervention, in target groups of patients having specific risks of developing complications during the use of certain classes of analgesics
Critères d'inclusion	M/F patients, $\geq 18$ years, have an ASA score of level 3 or 4 and having undergone a surgical intervention, including coeloscopy, excluding

cardiac surgery and neurosurgery, requiring analgic treatment through IV in order to relieve postoperative pain.  
Patients having at least one of the following risk factors: aged ? 65 years, OCPD including sleep apnea, high blood pressure, kidney, heart or liver failure.

## Type de population

Age  
Adulthood (19 to 24 years)  
Adulthood (25 to 44 years)  
Adulthood (45 to 64 years)  
Elderly (65 to 79 years)  
Great age (80 years and more)

Population concernée Sick population

Sexe  
Male  
Woman

Champ géographique National

Détail du champ géographique Metropolitan France

## Collecte

### Dates

Année du premier recueil 2007

Année du dernier recueil 2008

## Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus) [1000-10 000[ individuals

Détail du nombre d'individus 1829

## Données

Activité de la base Data collection completed

Type de données recueillies Clinical data

Données cliniques, précisions Direct physical measures

Existence d'une bibliothèque No

Paramètres de santé étudiés  
Health event/morbidity  
Health event/mortality

## Modalités

Mode de recueil des données      paper CRF

Suivi des participants              No

Appariement avec des sources  
administratives              No

## Valorisation et accès

### Valorisation et accès

#### Accès

Charte d'accès aux données  
(convention de mise à  
disposition, format de données  
et délais de mise à disposition)      publications

Accès aux données agrégées      Access on specific project only

Accès aux données individuelles      Access on specific project only